IETS OVER HET KWEEKEN

VAN

LARVEN VAN COLEOPTERA.

DOOR

Mr. A. F. A. LEESBERG.

In den afgeloopen zomer is het mij gelukt eenige poppen en larven van *Coleoptera* te kweeken; zij het ook niet zonder moeite.

In Juni vond ik bij Bergen-op-Zoom onder de schors van een dooden Canada-populier larven en poppen van een *Scolytus*. Ik deed wat boommolm en schors in een doosje met genoemde larven en poppen en had het genoegen, na ze dagelijks met wat koud water besprenkeld te hebben, een gaaf en een *verkrüppeltes* exemplaar van *Scolytus destructor* L. in het doosje te zien rondloopen. De poppen waren even als de pas uitgekomen kevers melkwit en eerst na drie dagen mocht ik een der ex. volkomen uitgekleurd vinden.

Gelijke ondervinding deed ik op in Juni; te Valkenburg zijnde, vond ik daar onder schors van een dooden esch een volkomen gaaf exemplaar van den zeldzamen *Aulonium trisulcum* Foucr., nieuw voor onze fauna en een witte pop, die na drie weken in vochtig hout bewaard te zijn, met mij de reis naar den Haag medemaakte en een fraai exemplaar van genoemden *Aulonium* leverde.

In September bij Maarsbergen met Dr. Everts een najaarsexcursie makende, vonden wij onder schors van een jongen dooden den talrijke larven, die mij toeschenen Elateriden-larven te zijn; wij dachten beiden aan *Campylus linearis*. Maar zie, ik

nam er een tiental mede en na twee dagen was een der larven verpopt en leverde na ± acht dagen een klein exemplaar van *Pytho depressus* L., dat zeer fraai uitkleurde. Deze soort werd eerst onlangs als inlandsch ontdekt. Ik heb thans nog drie larven in leven en hoop ze, altijd in vochtig molm, te doen overwinteren en uitkomen.